

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC LICHID CU MACRONUTRIENȚI: [PFC I(C)(I)(B)(I)]
SOLUȚIE DE ÎNGRĂȘĂMÂNT MINERAL (CA) (12) CU MICRONUTRIENȚI

CONȚINUT DECLARAT:
12,0 % w/w Oxid de calciu solubil în apă (CaO)
1,0 % w/w Bor solubil în apă (B)

Azot (N) sau pentoxid de fosfor (P2O5) peste 0,5 % din masă:
0,85 % w/w Azot (N)

LISTA DE INGREDIENTE:
Gluconat de calciu¹ (CAS: 299-28-5), Acid boric¹ (CAS: 10043-35-3),
¹Substanțe și amestecuri de materiale virgine.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
Set este un îngrășământ lichid care furnizează calciu și bor, elemente fundamentale pentru formarea și dezvoltarea fiziologică a fructelor. Tehnologia Stoller prezintă în formularea produsului asigură o nutriție adecvată pentru a interveni în mod natural în procesele fiziologice ale plantelor.

INSTRUCȚIUNI ȘI DOZE DE APLICARE						
Cultură				Stadiul de creștere		
Cereale	Grâu, orz, secară, triticale, Porumb, floarea-soarelui	✓	1,00%	300-600	Înainte de frunza steag BBCH 31-39 (231-239) Începutul înfloririi de-a lungul procesului de fructificație (BBCH 51-69)	1-2 aplicări la 15-30 zile
Oléaginose și leguminoase	Soia, rapiță, mazăre, fasole	✓				
Fructe	Protejate	✓			Între inflorescență și recoltă	5-12 aplicări la 7-15 zile 2-6 aplicări la 15-30 zile
Legume	Câmp deschis	✓				5-12 aplicări la 7-15 zile
Legume cu frunze	Protejate	✓	0,43%	700-1000	De la primele frunze	
	Câmp deschis	✓				
Tuberculi		✓			De la tuberizare la recoltare	
Bulbi		✓			De la formarea bulbilor la recoltare	
Legume rădăcinoase		✓			De la creșterea rădăcinilor la recoltare	
	Drupe, poame	✓	0,30%	1000-1500	De la căderea petalelor și în următoarele 50 de zile	2-6 aplicări la 15-30 zile
Livezi	Fructe tropicale, kaki, rodie	✓	0,15%	2000-2500	De la căderea petalelor inflorescenței feminine și în următoarele 50 de zile	
	Nuci	✓			De la răsărire la deschiderea frunzelor	
Puiet		✓	0,30%	700-1000	De la căderea petalelor și în următoarele 50 de zile	
Citrice		✓	0,12%	2500-3000	De la căderea petalelor și în următoarele 50 de zile	
Măslini		✓	0,15%	2000-2500	De la căderea petalelor și în următoarele 35 de zile	
Struguri	Struguri de masă	✓	0,60%	500-700	De la dezvoltarea vegetativă până la prima inflorescență 2-6 aplicări	
	Viță de vie	✓			De la dezvoltarea vegetativă și în timpul inflorescenței la 7-15 zile	
Fructe de pădure		✓	0,43%	700-1000		
Căpsuni		✓				
	Aplicare foliară				Tratamentul semințelor	Tratarea brazdelor
	Doza optimă				Volumul tratamentului (L)	Trat. Vol (L) min - max Frecvență

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați Stoller Europe sau distribuitorul Stoller Europe, sau consilierul dvs. tehnic, pentru recomandări mai specifice.

Observații:
Se recomandă aplicații foliare, cu soluții ușor acide. Vă recomand

C/ Max Planck, 1.
03203 Elche, Alicante (Spain)
(+34) 965 110 522
info@stollereurope.com
www.stollereurope.com

